



Aktivní kyslík rychlorozpustný granulát

určený k dezinfekci bazénové vody
ideálně působí v kom-binaci s aktivátorem
pro krystalicky průzračnou vodu

Návod k použití

Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota kyslíku: 5,0 - 8,0 ppm.

První dávkování: 200 g granulátu společně s 100 ml Kyslíkového aktivátoru na 10 m³ vody

Následné dávkování: týdně 100 g na 10 m³ vody (každých 14 dní doplnit 100 ml Kyslíkového aktivátoru).

Granulát sypte přímo do vody podél okrajů bazénu.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat hodnotu pH a obsah aktivního kyslíku ve vašem bazénu. Při vysokých teplotách, po bouřkách či intenzivním používání bazénu můžete použít krátkodobě rovněž Chlorový granulát. V případě, že bazén dlouhodobě nepoužíváte, doporučujeme vložit do skimmeru pomalurozpustnou chlorovou tabletu.

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Po kontaktu s pokožkou: veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

Po zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Po požití: vypijte velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, bezodkladně vyhledejte lékaře

Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, Skladujte uzamčené